

---

## 113 . Luncavița | Județ: Tulcea | Punct: Cetățuia | Anul: 2002

**Anul:** 2002

**Cod RAN:** 160699.02

**Perioade:** Preistorie, Antichitate

**Epoci:** Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului timpuriu, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană timpurie

**Categorii sit:** Domestic

**Autori:** Sorin Cristian Ailincăi, Adrian Bălășescu, Constantin Haită, Geanina Haită, Michel Maillé, Cristian Leonard Micu, Valentin Radu, Ilie Ștefan

**Instituții:** Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Național de Istorie a României, Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Național de Istorie a României, Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Național de Istorie a României, Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais, France, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Național de Istorie a României, Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Școala Generală Luncavița

### Raport preliminar arheozoologie (nevertebrate, reptile, pești)

#### Raport

În campania din 2002 datorită orientării săpăturilor către sondajele stratigrafice materialul arheozoologic a fost obținut doar prin cernerea la sec a sedimentului rezultat din nivelul cultural Gumelnița. Din această cauză în compoziția faunistică nu există schimbări. Aceeași taxoni au fost determinați: Mollusca, Pisces și Reptilia.

Mollusca. Este prezentă de 82 resturi ale bivalvelor *Unio pictorum*, *Unio tumidus*, *Unio crassus*, *Anodonta cygnaea*, și *Cardium* (*Cerastoderma*) edule. Dintre melci au fost identificate doar 2 resturi aparținând gasteropodului *Cepaea vindobonensis*.

Pisces. S-au identificat 2523 resturi de pești dintre care s-au determinat 36,5%. Spectrul taxonomic nu diferă față de eșantioanele anterioare. Am determinat resturi aparținând taxonilor comuni în Dunăre ca: morunul (*Huso huso*), păstrugă (*Acipenser stellatus*), știuca (*Esox lucius*), platica (*Abramis brama*), avat (*Aspius aspius*), batcă (*Blicca bjoerkna*), crap (*Cyprinus carpio*), babușca (*Rutilus rutilus*), roșioara (*Scardinius erythrophthalmus*), lin (*Tinca tinca*), somn (*Silurus glanis*), bibanul (*Perca fluviatilis*) și șalău (*Stizostedion lucioperca*).

Reptilia. Doar broasca țestoasă de apă *Emys orbicularis* a fost identificată prin 55 resturi de plastron și carapace.

Studiul materialului din această campanie nu aduce mari noutăți față de anii precedenți. Ca o noutate putem considera doar prezența a încă două noi specii de cyprinide în contul peștilor, fapt datorat cernerii sedimentului.

Cum am menționat și anul precedent abordare unei noi strategii de prelevare va putea verifica rezultate obținute, fapt ce ne va ajuta să tragem concluzii pertinente despre ultimul nivel de locuire eneolitic.

---

#### Informații suplimentare online

[Raportul 2010 din cronica.cimec.ro](http://raportul.2010.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](http://localizare.pe.harta.folosind.Mapserver.Cimec.ro)