
137 . Petreștii de Jos | Județ: Cluj | Punct: Cheile Turzii - Peștera Ungurească | Anul: 2005

Anul: 2005

Cod RAN: 58927.03

Perioade: Preistorie, Evul Mediu, Perioada modernă

Epoci: Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului timpuriu, Epoca bronzului, Evul Mediu, Perioada modernă

Categorii sit: Domestic

Autori: Beatrice Ciută, Gheorghe Lazarovici

Instituții: Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Universitatea "Eftimie Murgu", Reșița

Raport

Resturile de cărbune (raport selectiv)

Dintre speciile descoperite în cadrul probelor de cărbune, se remarcă ponderea grăuncioarelor de Cerealia, totalizând în jur 113 cariopse. Între acestea, predomină specia de grâu de tip emmer, *Triticum dicoccum*, cu cele 36 de semințe relevate. Pe lângă grâul de tip emmer, a fost descoperit și cel de tip einkon, *Triticum monococcum*, înregistrat sub forma a 9 cariopse. Prezența sporadică a unei semințe de *Panicum miliaceum* (mei), este nerelevantă dar merită semnalat faptul că specia de mei a mai fost descoperită într-o perioadă similară și în cadrul sitului de la Limba - Bordane (7-9).

Legumele sunt slab reprezentate, în sensul că a fost descoperită specia *Lens esculenta* sub forma a două cotiledoane care probabil, aparțineau aceleași semințe.

Aparținând categoriei fructelor, cea mai importantă descoperire, este specia de *Cornus mas*, relevată sunt forma a 19 sâmburi întregi și 29 fragmente de coajă de sâmburi, fapt mai rar întâlnit până acum în contextele arheologice. *Cornus mas* este un arbust sau o tufă de mici dimensiuni, răspândit peste tot în sudul și centrul Europei, în bazinul Mării Negre și în Caucaz (8, 9). Le Chei apare pe tot drumul de acces spre peșteră. Tot în categoria fructe, și ca descoperire importantă, poate fi inclusă și determinarea a 3 sâmburi de *Prunus avium*/*Cerasus avium* (cireș pădureț). Important de menționat, este că această descoperire este practic prima semnalare a speciei pe teritoriul României, păstrată în contexte din această perioadă. Este vorba de specia sălbatică, deoarece specia cultivată va apărea abia în perioada romană (8, 9). Cu semne de întrebare trebuie reținute materialele din Proba 2, carou E4, groapa de animal din spatele cuptorului deoarece nu știm din ce perioadă este groapa de animal, în special pentru sâmburii de *Cornus mas* dar ele apar și în orizonturi nederanjate. Cele mai apropiate lanuri de cereale sunt la mai bine de 2 km ceea ce nu este firesc ca de acolo animalul să transporte până la peșteră.

Informații suplimentare online

[Raportul 3463 din cronica.cimec.ro](#)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](#)
